

Ibuprofeno 2% V.L.

Ibuprofeno 2% Suspensión



Suspensión

Sabor Tutti Frutti

Venta libre
Industria Argentina

¿Qué contiene IBULGIA® 2% V.L. sabor Tutti Frutti?

Contiene cada 100 mililitros:

Ibuprofeno 2,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, Polisorbato 80, Sacarina sódica, Benzoato de sodio, Ácido cítrico anhidro, Colorante rojo punzó 4R, Sabor tutti frutti, Agua purificada.

Suspensión

Sabor Naranja

¿Qué contiene IBULGIA® 2% V.L. sabor Naranja?

Contiene cada 100 mililitros:

Ibuprofeno 2,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, Sacarina Sódica, Benzoato de Sodio, Polisorbato 80, Ácido Cítrico, anhidro, Sabor Naranja, Colorante amarillo ocazo, Agua purificada.

Acción:

- Analgésico (calma el dolor)
- Antifebril (baja la fiebre)
- Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa IBULGIA® 2% V.L.?

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, de dientes, menstruales) asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Cómo usar este medicamento?

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas. En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas. No administrar más de 3 veces al día.

Edad (años)	Peso (Kilos)	Dosis (mililitros)
Menores de 2	Menos de 11	Consulte a su médico
2 a 3	11 a 15	5
4 a 5	16 a 21	7.5
6 a 8	21 a 27	10
9 a 10	27 a 32	12.5
Más de 10	Más de 32	15

El producto se presenta junto a una medida dosificadora graduada para facilitar la administración de la suspensión.

AGITAR BIEN EL PRODUCTO PREVIAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN

¿Qué personas no pueden recibir IBULGIA® 2% V.L.?

No use este medicamento si:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad de hígado, riñón o corazón.
- No utilizar contra el dolor de estómago.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte con su médico en estos casos:

- Es Mayor a 65 años.
- Tiene asma o alergia
- Tiene presión arterial
- Tiene problemas circulatorios
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez)
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos, ante esta eventualidad consulte con su médico.
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Consulte a su médico en estos casos:

- No obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- En el caso de dolor de garganta, si dura más de 2 días con igual intensidad.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Aparecen síntomas nuevos
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé de más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" (Gallo 1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital General de Niños Pedro Elizalde (Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 2200 int.6217

Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (Cerviño 3356 C1425AGP CABA): (011) 4808-2600

Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. Illia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0-800-333-0160

Hospital De Niños "Sor María Ludovica" (Calle 14 1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 453-5901 / Línea Gratuita: 0-800-222-9911

Presentación:

Envase conteniendo un frasco con 90 mililitros sabor naranja o con 90 mililitros sabor tutti frutti.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar en ambiente seco a temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENER ESTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. AGÍTESE ANTES DE USAR.

NO UTILIZAR DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 54.597

Fecha de última revisión: 10/2021

Elaborado en: Salom 657 C1277ABG, C.A.B.A.

Dirección Técnica: Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455

BIOSINTEX S.A.

Salom 657 C1277ABG, C.A.B.A.



Si tiene alguna pregunta puede comunicarse a los siguientes números:

Consultas: 0810 777 6327

ANMAT Responde: 0800-333-1234

O por mail:

consultas@biosintex.com.ar

Página Web: www.biosintex.com.ar